

# Cabinet Dentaire du Docteur Catherine SICOLI

Médecin-Dentiste au Luxembourg, diplômée de la faculté de Médecine de Paris V

70, route d'Esch - L-1470 LUXEMBOURG - Tél. : 27 44 91 00 Parking privatif gratuit

<http://dr-sicoli-catherine-medecin-dentiste.lu>

À L'ATTENTION PERSONNELLE DE \_\_\_\_\_

FICHE CONSEIL N° **6.17**

Rubrique : Les implants

## La mise en charge immédiate d'une prothèse sur un implant

**Les techniques de mise en charge immédiate sont des techniques chirurgicales spécifiques qui permettent de fixer une prothèse provisoire fixe immédiatement après la pose de l'implant.**

Dans la majorité des situations cliniques il est nécessaire d'attendre de 2 à 6 mois avant de fixer une prothèse sur un implant. C'est le délai nécessaire pour l'obtention de l'ostéointégration. Pour obtenir cette intégration à l'os, l'implant ne doit pas être mobilisé durant cette période critique, sous peine de risque d'échec.

- Dans certains cas favorables, il est cependant possible de placer une prothèse fixe provisoire très rapidement sur l'implant : c'est la mise en charge immédiate.

Une situation clinique se prête particulièrement à cette mise en charge : celle des dents antérieures visibles dans le sourire.

Lorsqu'une dent antérieure est à remplacer **et que les conditions osseuses le permettent**, il est possible de mettre en place une dent provisoire sur l'implant.

**Pour cela, il faut :**

- Une excellente stabilité de l'implant au moment de son placement
- Ne pas mordre sur la dent provisoire pendant une période de 2 à 6 mois c'est-à-dire durant l'intégration osseuse

La dent prothétique est d'ailleurs prévue comme étant légèrement plus petite afin d'éviter tout contact avec les dents antagonistes.



### Avantages

- Fixation de la prothèse implanto-portée quelques heures après la pose de l'implant
- Rétablissement rapide des besoins esthétiques et fonctionnels
- Réduction des séances nécessaires au traitement et au suivi postopératoire
- Suppression de la crainte d'une période d'édentement lors de la pose d'un implant
- Pas de gêne liée à l'instabilité d'une prothèse provisoire amovible

*Après la pose d'un implant la mise en charge immédiate permet d'éviter un édentement ou le port d'une prothèse amovible*

*Cette technique n'est cependant envisageable que sous certaines conditions*

### Nos conseils

- L'objectif de la mise en charge immédiate n'est pas de mastiquer tout de suite sur la prothèse mais d'apporter une solution de confort et un aspect esthétique.
- Chaque fois que cette intervention est envisageable, elle permet de gagner du temps en conservant le même taux de succès à la pose de l'implant.
- Si cette technique présente une ou des contre-indications elle est formellement à éviter.